

禽流感、流行性感冒、SARS 之不同為何？

	禽流感	流行性感冒	SARS
病原體	H5N1 、 H7N2	H1 、 H2 、 H3 、 N1 、 N2	SARS CoV.
病徵	頭痛、發高燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、肌肉關節痛、嘔吐、食慾不振、腹瀉等，與流感極為相似，難以辨別	發高燒、全身痠痛、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛	發高燒 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 、乾咳、呼吸急促或呼吸困難。可能伴隨症狀：包括頭痛肌肉僵直、食慾不振、倦怠、意識紊亂、皮疹及腹瀉。胸部 X 光檢查可發現肺部病變
潛伏期	5-9 天	約 1-3 天，發病前、後均有傳染力	3-10 天，無證據顯示潛伏期會傳染他人
傳染途徑	接觸禽鳥糞便、糞便乾掉後隨灰塵揚起被人吸入	飛沫傳染	與病人密切接觸，吸入或黏膜接觸病人的飛沫或體液而感染
預防	避免接觸禽鳥，洗手	打流感疫苗	一般人發燒戴平面口罩、勤洗手、量體溫、少探病
治療	抗流感病毒藥物，如克流感	抗流感病毒藥物，如克流感	支持療法、干擾素、抗病毒藥物、抗生素等
高危險行業	農牧業、屠宰業、醫療照護業、相關研究實驗室	無，一般人	醫療照護業、相關研究實驗室